

PROTOCOLE MILK BAR

Les deux premières semaines sont cruciales : commencez l'allaitement à débit contrôlé dès la naissance du veau.

JOURS 1-3 : DÉMARRAGE

- Pour le colostrum, utilisez la tétine d'apprentissage jaune.
- Installez votre tétine à 24 pouces (60 cm) du sol.
- Rincez et lavez l'équipement à chaque repas.
- Placez votre tétine pour que les côtés plats de la base soient à l'horizontale.

CONSEIL DE PRO

Par jour, donnez 2-3 repas de 4 L de bon colostrum pour une meilleure santé!

JOURS 4-14 : DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL

Pour des résultats optimaux, évitez de déménager les veaux avant 12 à 14 jours (diminution du stress).

- Veuillez prendre une tétine noire neuve.
- Installez votre tétine à une hauteur de 24 à 26 pouces (60 à 66 cm) du sol.
- Rincez avec de l'eau tiède et laissez sécher l'équipement à chaque repas. Au minimum 2 fois par semaine, lavez l'équipement avec de l'eau chaude mélangée à un savon alcalin et une brosse avec des poils en nylon.
- N'oubliez pas de donner de l'eau fraîche et des nutriments secs à vos veaux.

JOUR 14 AU SEVRAGE : REGROUPEMENT

NOURRISSEURS DE GROUPE

- Regroupez les veaux (écart d'âge de 2 semaines maximum dans le même groupe).
- Faites suivre la tétine noire vers le nourrisseur de groupe Milk Bar de votre choix.
- Installez votre tétine à une hauteur de 24 à 26 pouces (60 à 66 cm) du sol.
- Continuez le même protocole de nettoyage des équipements.

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE LAIT

- Regroupez les veaux ensemble une fois par semaine, lors du changement de la tétine.
- Changez la tétine aux 5 à 7 jours ou après 700 L de lait ou lors de l'entrée de veaux plus jeunes à la louve.
- Privilégiez une hauteur de la tétine à 26 pouces (66 cm) du sol.
- Ajustez les ailes de la tétine pour qu'elles soient à l'horizontale de l'adaptateur de la louve.
- Continuez le même protocole de nettoyage des équipements.



LE SECRET?
Laissez les veaux boire à leur rythme !

AGRICLÉ